

Clobetasol Propionato

Crema tópica 0,05%

Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este medicamento. Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está seguro de algo pregunte a su médico o químico farmacéutico. Guarde este folleto puede necesitar leerlo nuevamente. Verifique que este medicamento corresponda exactamente al indicado por su médico.

Composición y presentación:

Cada 100 g de crema contiene: Clobetasol propionato 0.05 g

Excipientes: Alcohol cetosteárico, polioxil -20 cetileter, clorecresol, citrato de sodio dihidrato, ácido cítrico anhidro para ajuste de pH, propilenglicol, vaselina líquida, agua purificada, vaselina sólida.

Indicaciones:

tratamiento a corto plazo de manifestaciones inflamatorias y pruríticas de dermatosis que no responden a corticoides menos activos.

Clasificación:

Corticoterapia tópica.

Advertencias:

Úsese sólo por indicación y bajo supervisión médica. No utilizar por periodos prolongados. No aplicar en los ojos.

Debido a la potencia de la droga existe la posibilidad de causar efectos adversos generales durante la terapia tópica.

No usar vendajes oclusivos.

Contraindicaciones:

- No usar en presencia de lesiones cutáneas infectadas de origen bacteriano, micótico (hongos), viral o parasitario.

- Tratamiento de acné, rosácea, dermatitis perioral o en el tratamiento de placas de psoriasis extensas. Lesiones ulcerosas.

- Hipersensibilidad a la droga, a otros corticoides o a algún otro ingrediente de la formulación.

- No administrar a niños menores de 12 años. (Riesgo de absorción).

Interacciones:

Informe a su médico de todos los medicamentos que está usando, incluyendo aquellos que usted ha adquirido sin receta. No se han descrito interacciones.

Efectos indeseables:

El uso de este medicamento puede producir los siguientes efectos que normalmente no requieren atención médica: escozor, sequedad, irritación, prurito o enrojecimiento de la piel leve y transitorio al aplicar la crema.

Reacciones adversas:

Si usted presenta al una de las siguientes reacciones adversas mientras esté en tratamiento con este producto, acuda a su médico: Dermatitis alérgica por contacto; ardor y prurito cutáneo; foliculitis, furunculosis, pústulas. Hormigueo de los dedos de las manos, adelgazamiento de la piel con facilidad para los hematomas. Acné o piel grasa especialmente cuando se usa en la cara. Síndrome de Cushing: rosita redondeado o cara de luna, cansancio o debilidad no habituales.

Precauciones:

- De utilizar en áreas extensas o bajo oclusión, debe considerarse la posibilidad de absorción sistémica.
- Si está embarazada o amamantando consulte a su médico antes de usar este medicamento.
- En pacientes geriátricos; se recomienda precaución por ser más probable que produzca púrpura y laceración cutánea.

Dosis:

El médico debe indicar la osología y el tiempo de tratamiento apropiadas a su caso particular. No obstante, la dosis usual recomendada es:

Aplicar, mediante masaje suave, una fina capa de Clobetasol crema, 2 veces diarias, preferiblemente en la mañana y en la tarde. La duración de la terapia no debe ser superior a 14 días. No aplicar con vendaje oclusivo.

Modo de empleo:

Aplicar la crema o el ungüento tópicamente sobre la piel. En lo posible, utilizar por periodos cortos y sobre zonas pequeñas. No aplicar en los ojos ni alrededor. No utilizar ningún tipo de vendaje o cobertura en la zona tratada, a menos que el médico lo prescriba.

Sobredosis:

En caso de síntomas de sobredosis, consultar en un centro asistencial para el tratamiento que corresponda. Llevar este folleto informativo.

Condiciones de almacenamiento:

Mantener lejos del alcance de los niños; en su envase original; protegido del calor. No use este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

No repita el tratamiento sin indicación médica.

No recomiende este medicamento a otra persona.