

Frenaler-d

Cápsulas con granulos De liberación prolongada

Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este medicamento.

Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está seguro de algo pregunte a su médico o químico farmacéutico. Guarde este folleto puede necesitar leerlo nuevamente. Verifique que este medicamento corresponda exactamente al indicado por su médico.

Composición y presentación:

Cada cápsula con gránulos de liberación prolongada contiene: Loratadina 5 mg

Pseudoefedrina 120 mg (como sulfato)

Excipientes: Dióxido de silicio coloidal, manitol, azúcar, talco, lactosa monohidrato, almidón de maíz, povidona, estearato de magnesio, etilcelulosa, colorante FD&C Azul N° 1, colorante FD&C Rojo N°40, polietilenglicol, macrogol, polisorbato , dióxido de titanio, gelatina.

Clasificación:

Antihistamínico. Descongestionante.

Indicaciones:

Alivio sintomático de la congestión de la mucosa de las vías respiratorias altas (nasal, sinusal), estornudos y rinorrea, asociados al resfrío común y a la rinitis alérgica.

Contraindicaciones:

No administrar a personas con Insuficiencia hepática, en mujeres embarazadas o durante el período de lactancia. No usar en presencia de ataque agudo de asma. También está contraindicado en pacientes con glaucoma de ángulo cerrado, retención urinaria y pacientes con hipertensión severa, insuficiencia coronaria grave e hipertiroidismo.

Interacciones:

Informe a su médico de todos los medicamentos que está usando, incluyendo aquellos que usted ha adquirido sin receta. Se han descrito interacciones con las Benzodiazepinas, Inhibidores de la monoaminoxidasa (I-MAO), Antidepresivos, Alcohol, Anticolinérgicos, Antitiroideos, Epinefrina.

Reacciones adversas:

El uso de este medicamento puede producir los siguientes efectos que normalmente no requieren atención médica; Cambios en la visión (visión borrosa), confusión, mareos, sequedad de la boca, nariz o garganta, sensación de desmayo, pérdida del apetito. Si se presenta alguna de las siguientes reacciones adversas mientras esté en tratamiento con este producto y/o si presenta algún otro efecto o síntoma no descrito en este folleto consulte a su médico: Latidos cardiacos rápidos o irregulares, zumbido de oídos, reacción de hipersensibilidad (espasmo bronquial, inflamación de la boca, garganta, dificultad respiratoria), aumento de la presión arterial, retención urinaria.

Precauciones advertencias:

Usar con precaución en personas que sufren de epilepsia, obstrucción del cuello de la vejiga, hipertrofia prostática. Evitar la ingesta de bebidas alcohólicas. Posible interferencia con las pruebas cutáneas que utilizan alérgenos; es necesario informar

Dosis:

El médico debe indicar la posología y el tiempo de tratamiento apropiados a su caso particular. No obstante, la dosis usual recomendada es:

Adultos y niños mayores de 12 años: 1 gragea cada 12 horas, preferentemente una en la mañana y otra en la noche.

Modo de empleo:

Administrar por vía oral.

Tomar las grageas con agua, leche o con los alimentos para evitarlos efectos de irritación gástrica. Debe ingerirse entera sin partir ni masticar.

Sobredosis:

En caso de sospecha de sobredosis, trasladar al enfermo a un centro asistencial en donde se le realizará un tratamiento sintomático y de mantención. Llevar este folleto de información.

Condiciones de almacenamiento:

Mantener en su envase original; protegido del calor, la humedad, a no más de 30°C y del alcance de los niños. No use este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

No repita el tratamiento sin indicación médica.

No recomiende este medicamento a otra persona.