

Gentamicina betametasona

Solución oftálmica

Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este medicamento. Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está seguro de algo, pregunte a su médico o química farmacéutico. Guarde este folleto, puede necesitar leerlo nuevamente. Verifique que este medicamento corresponda exactamente al indicado por su médico.

Composición y presentación:

Cada mL contiene: Gentamicina (como sulfato) 3mg, Betametasona sodio fosfato 1mg. Excipientes: Cloruro de sodio, fosfato dibásico de sodio anhidro, fosfato monobásico de sodio dihidrato, cloruro de benzalconio, agua purificada estéril.

Clasificación:

Antibiótico aminoglicosídico oftálmico. Antiinflamatorio ocular esteroideal.

Indicaciones:

Tratamiento de infecciones superficiales del ojo, causadas por bacterias sensibles. También está indicada en inflamación ocular con infección bacteriana o riesgo de ella como lesión en la córnea por quemaduras de diversa índole y estados inflamatorios post-quirúrgicos, uveítis (inflamación de la úvea).

Advertencias:

Úsese sólo por indicación y bajo supervisión médica. Sólo para uso oftálmico.

Contraindicaciones:

No usar en pacientes con hipersensibilidad a alguno de los componentes de la fórmula.

Interacciones:

Informe a su médico de todos los medicamentos que esta usando, incluyendo aquellos que usted ha adquirido sin receta. No se han descrito interacciones con otros medicamentos.

Efectos indeseables:

El uso de este medicamento puede producir los siguientes efectos que normalmente no requieren atención médica: Sensación de ardor y/o picazón en el ojo.

Reacciones adversas:

Si usted presenta alguna de las siguientes reacciones adversas mientras esté en tratamiento con este producto consulte a su médico: Reacción de hipersensibilidad caracterizada por: rash cutáneo, enrojecimiento, picazón, hinchazón u otro signo de irritación.

Reacciones como: aumento de la presión ocular, glaucoma, retardo de la cicatrización de heridas y formación de cataratas, pueden ser inducidas por los corticosteroides (betametasona).

Precauciones:

Cumplir el ciclo completo del tratamiento. Consultar a su médico, si no se produce mejoría en unos días. No se ha establecido la seguridad del uso prolongado de corticosteroides oftálmicos en mujeres durante el embarazo o la lactancia.

Dosis:

El médico debe indicar la posología y el tiempo apropiados a su caso particular, no obstante, las dosis usuales recomendadas son:

-Una a dos gotas. Tópico cada 3 - 6 horas.

Modo de empleo:

Aplicar las gotas dentro del ojo y el ungiendo oftálmico en el borde de los párpados. Usar el unguento preferentemente en la noche, como complemento de la suspensión oftálmica.

Sobredosis:

No descritas dada la vía de administración.

Condiciones de almacenamiento:

Mantener en su envase original; protegido del calor y fuera del alcance de los niños.

No use este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

No repita el tratamiento sin indicación medica.

No recomiende este medicamento a otra persona.