

Paroxetina

Comprimidos recubiertos 20 mg

Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este medicamento. Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está seguro de algo pregunte a su médico a químico farmacéutico. Guarde este folleto puede necesitar leerlo nuevamente. Verifique que este medicamento corresponda exactamente al indicado por su médico.

Composición y presentación:

Paroxetina 20 mg comprimidos recubiertos

Cada comprimido recubierto contiene:

Paroxetina (Clorhidrato hemihidrato) 20mg

Excipientes: Almidón glicolato de sodio, magnesio estearato, celulosa micro cristalina, calcio fosfato, poliacrilatos dispersión, talco, titanio dióxido, simeticona, macrogol, hipromelosa.

Indicaciones:

Tratamiento de la depresión.

Clasificación:

Antidepresivo.

Contraindicaciones:

Hipersensibilidad conocida a Paroxetina.

Paroxetina está contraindicada en pacientes que reciben o han recibido recientemente, inhibidores de la monoaminoxidasa. Sus administraciones deben ser separadas por lo menos por 2 semanas de diferencia.

Riesgos y beneficios deben ser evaluados en los siguientes problemas médicos.

- Historia de abuso y dependencia de drogas.
- Función hepática con insuficiencia severa.
- Historia de manía.
- Función renal con insuficiencia severa
- Embarazo, lactancia. No administrar a menores de 18 años.

Interacciones:

Posibles interacciones con inductores de enzimas hepáticas, enzimas hepáticas inhibidoras y medicamentos que son metabolizados por el sistema enzimática hepático P450 (Incluyendo antidepresivos tricíclicos, fenotiazinas y antiarrítmicos, tipo IC).

Un estado potencialmente letal hiperserotoninérgico es conocido como síndrome serotoninérgico puede ocurrir si un agente serotoninérgico, como Paroxetina, es administrado con inhibidores de MAO u otros agentes que afecten el mecanismo serotoninérgico.

La administración conjunta de Paroxetina y Litio debe realizarse con especial precaución. No administrar Paroxetina conjuntamente con agentes anticoagulantes.

El efecto sedante de antidepresivos y alcohol puede ser potenciado por la Paroxetina. La administración conjunta de Paroxetina y triptofano puede producir agitación, intranquilidad y trastornos gastrointestinales.

La administración conjunta de Paroxetina con Fenitoína puede traducirse en una disminución de los niveles plasmáticos de Paroxetina y en reacciones adversas más pronunciadas. La administración conjunta de Paroxetina y fármacos con acción inhibitoria sobre convulsiones de origen central (antiepilépticos) puede producir igualmente reacciones adversas.

Reacciones adversas:

Aquellas que requieren atención médica sólo si continúan o son molestas:

- Las más frecuentes son: astenia; constipación: diarrea; vértigo; somnolencia; sequedad de la boca; dolor de cabeza; aumento de sudoración; insomnio; náusea; disfunción sexual, especialmente disturbios en eyaculación; temblor; retención urinaria; vómito.

- Los menos frecuentes: Ansiedad o nerviosismo; visión borrosa: disminución del libido; disminución o incremento del apetito; palpitación; parestesia.

Individuos con alto consumo de alcohol o con antecedentes de enfermedad renal o hepática; controlar las funciones hepáticas.

- Aquellas que requieren atención médica:

Incidencia menos frecuente: Agitación; mialgias; miastenia o miopatía; hipotensión ortostática; rash cutáneo.

Rara incidencia: Síntomas extra piramidales, incluyendo akinesia o hipokinesia, diskinesia, distonía y disartria, hiponatremia, manía o hironanía, síndrome serotoninérgico.

Aquellas que requieren atención médica si aparecen luego de retirar el medicamento son agitación, confusión o inquietud, diarrea, vértigos, dolor de cabeza, insomnio, disturbios de migraña visual, mialgia, náuseas o vómitos, rinorrea.

Dosis:

La que su médico le indique de acuerdo al cuadro clínico que se trate.

Modo de empleo:

Oral.

Sobredosis:

Síntomas en caso de sobredosis: Dilatación de las pupilas; somnolencia severa; sequedad de la boca; náuseas severas; taquicardia sinusal; temblor severo; vómitos severos.

Tratamiento en caso de sobredosis:

No existe antídoto específico para Paroxetina. El tratamiento es esencialmente sintomático o de soporte:

- Estabilizar y monitorear la respiración.

- Monitoreo de la función cardíaca y signos vitales.

- Descontaminar el tracto gastrointestinal por emesis, lavado o ambos, seguido de la administración de 20 a 30 gramos de carbón activado durante las próximas 24 a 48 horas seguidas a la ingestión del medicamento.

Debido al amplio volumen de distribución de Paroxetina, diuresis forzada, hemodiálisis, hemoperfusión o transfusiones no son probablemente beneficiosas.

Condiciones de almacenamiento:

Mantener lejos del alcance de los niños; en su envase original; a temperatura ambiente, protegido de la luz y humedad. No use este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

No repita el tratamiento sin indicación médica.
No recomiende este medicamento a otra persona.