

Prednisona

Comprimidos recubiertos

Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este medicamento. Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está seguro de algo pregunte su médico o químico farmacéutico. Guarde este folleto. Puede necesitar leerlo nuevamente. Verifique que este medicamento corresponda exactamente al indicado por su médico.

Composición:

Cada comprimido recubierto contiene: Prednisona 20 mg
Excipientes: lactosa monohidrato, celulosa microcristalina, magnesio estearato, almidón glicolato de sodio, polímero catiónico de dimetilamimetil metacrilato, talco, titanio dióxido, macrogol.

Indicaciones:

Indicado en desórdenes endocrinos, respiratorios, hematológicos y reumáticos. Es también utilizado en enfermedades dermatológicas, neoplásicas y de colágeno, en tratamientos de alergias y de otros desórdenes en que el uso de glucocorticoides adrenales es beneficioso.

Clasificación:

Corticoterapia oral.

Advertencias:

Úsese sólo por indicación y bajo supervisión médica. Al suspender la medicación, después de un tratamiento prolongado, se puede producir síndrome de privación caracterizado por dolor abdominal o de espalda, mareos, desmayos, fiebre, pérdida prolongada del apetito, dolor muscular o articular, sensación de falta de aire, dolores de cabeza inexplicables y continuos, cansancio o debilidad no habituales, reaparición de los síntomas de la enfermedad tratada. Si se presenta alguno de estos síntomas, se recomienda visitar a su médico.

Contraindicaciones:

No usar en caso de: úlcera gastroduodenal activa, osteoporosis severa, herpes zoster activo, tuberculosis activa sin tratamiento, infecciones generalizadas por hongos. Alteraciones psiquiátricas. Glaucoma. Hipertensión Arterial.
Embarazo y Lactancia: No usar en el embarazo, salvo absoluta necesidad y por periodos breves.

Interacciones:

Informe a su médico de todos los medicamentos que está usando. Incluyendo aquellos que usted ha adquirido sin receta. Se han descrito interacciones con los siguientes productos: Diuréticos (Furosemida, hidroclorotiazida). Antihipertensivos, Hipoglicemiantes orales, Barbitúricos, Carbamazepina. Fenitoína. Rifampicina, antiinflamatorios no esteroideos. Glucósidos digitálicos, Calcio, Antiácidos. No se aconseja su asociación sin supervisión médica.

Reacciones adversas:

El uso de corticoides por vía oral o inyectable requiere de supervisión constante del médico. Este medicamento puede producir algunos efectos que normalmente no requieren atención médica a no ser que los síntomas persistan o sean muy molestos: Aumento del apetito, indigestión, nerviosismo o inquietud, dificultad para dormir. Mareos o somnolencia; rubor en la cara o mejillas, dolor de cabeza; crecimiento de vello en el cuerpo o en la cara.

Si se presenta alguna de las siguientes reacciones adversas mientras este en tratamiento con este producto. acuda a su médico: Trastornos del ánimo o de la conducta. Dolor en los ojos y trastornos de la visión (cataratas). Osteoporosis. Mayor susceptibilidad a infecciones. Ulcera gastroduodenal. Diabetes (micción frecuente, aumento de la sed). Hipertensión arterial. El uso a largo plazo, puede provocar Enfermedad de Cushing (rostro redondeado o cara luna, por retención de agua).

Precauciones:

Se deberá evaluar cuidadosamente el riesgo de su uso en el embarazo, durante la lactancia y en niños. Los corticosteroides pueden agravar la inestabilidad emocional o las tendencias psicóticas. Tratamiento prolongados pueden provocar una Insuficiencia suprarrenal; discontinuar el tratamiento gradualmente.

Dosis:

La dosis que su médico le indique.

Modo de empleo:

Se administra por vía oral. Tomarlo con alimento para minimizar la irritación gastrointestinal; el alcohol puede potenciar los efectos ulcerogénicos de este medicamento.

Sobredosis:

Los síntomas corresponden a los descritos en las reacciones adversas pero de forma más acentuada. Si aparecen síntomas agudos, trasladar al enfermo a un centro asistencial para el tratamiento de los síntomas y medidas de mantención necesarias.

La sobredosis crónica, se trata reduciendo la dosis o suspendiendo el corticosteroide por un período que el médico determine.

Condiciones de almacenamiento:

Mantener lejos del alcance de los niños; en su envase original; protegido del calor, la luz y la humedad. No use este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

No repita el tratamiento sin indicación médica.

No recomiende este medicamento a otra persona.