

## **Vironida**

Aciclovir Comprimidos

Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este medicamento. Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está seguro de algo pregunte a su médico o químico farmacéutico. Guarde este folleto puede necesitar leerlo nuevamente.

### **Composiciones y presentaciones:**

Cada comprimido contiene: Aciclovir 800 mg.

Excipientes: polividona, almidón glicolato sódico, estearato de magnesio, colorante FD&C azul No 2 lacado, celulosa microcristalina.

### **Clasificación:**

Antiviral

### **Indicaciones:**

- Tratamiento de infecciones causadas por el virus herpes simple en la piel y membranas mucosas, incluyendo el herpes genital simple y recurrente.
- Tratamiento supresor (prevención de recurrencias) de infecciones recurrentes causadas por virus herpes simple en pacientes inmunocompetentes.
- Profilaxis de las infecciones causadas por virus herpes simple.
- En pacientes inmunocomprometidos (pacientes transplantados, bajo tratamiento con quimioterápicos o infectados por VIH).
- Tratamiento de la varicela y herpes Zoster.

### **Advertencias:**

Úsese sólo por indicación y bajo supervisión médica. Cumplir estrictamente con el ciclo completo de tratamiento. Esta terapia no elimina el virus infectante del organismo. Los pacientes afectados de herpes genital, deben abstenerse de contacto sexual mientras existan lesiones visibles, para evitar el contagio de la pareja.

### **Contraindicaciones:**

No usar en caso de hipersensibilidad al medicamento o productos relacionados.

### **Interacciones:**

Informe a su médico de todos los medicamentos que está usando, incluyendo aquellos que usted ha adquirido sin receta. Se han descrito interacciones con los siguientes productos: Metotrexato, Anfotericina B, Meperidina, Interferón.

### **Efectos indeseables y reacciones adversas:**

El medicamento generalmente es bien tolerado, pero puede producir los siguientes efectos secundarios que normalmente no requieren atención médica: náuseas, vómito, cefalea. Puede provocar reacciones de hipersensibilidad en la piel. Los efectos adversos pueden

aumentar con los tratamientos prolongados. Si se produce una exacerbación de los efectos recién descritos, consultar al médico.

**Precauciones:**

Usar sólo bajo estricta vigilancia médica en:

- Embarazo
- Durante la lactancia
- Niños
- Ancianos

En pacientes con insuficiencia renal, deshidratación o anormalidades neurológicas, la vigilancia debe ser aún más estrecha.

**Dosis:**

El médico debe indicar la posología y el tipo de tratamiento a su caso particular, no obstante la dosis usual recomendada es:

- Herpes Zoster: 800 mg cada 4 horas por un período de 7 a 10 días.
- Herpes simple: 200 mg cada 4 horas por 10 días.
- Varicela: Niños bajo los 40 Kg. de peso: 80 mg/día repartidos en 4 tomas diarias. Niños con un peso superior a los 40 Kg. y adultos: 800 mg. 4 veces al día por un período de 5 días.

Debe evitar olvidar alguna toma y respetar los horarios.

Si no cumple el tratamiento lo más probable es que la enfermedad se vuelva a presentar con mayor intensidad y este medicamento ya no le servirá para detener la infección.

**Modo de empleo:**

Los comprimidos se administran por vía oral, con un vaso de agua.

**Sobredosis:**

No se han descrito síntomas graves por sobredosis. En presencia de sobredosis, trasladar a la persona afectada a un centro asistencial de urgencia para el tratamiento de los síntomas y el control de las funciones comprometidas. Llevar este folleto de información.

**Condiciones de almacenamiento:**

Mantener en su envase original, protegido del calor, humedad y fuera del alcance de los niños.

No use este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

No repita el tratamiento sin consultar antes con el médico

No recomiende este medicamento a otra persona.