

Anbax

¿Cuál es la información más importante que debo conocer acerca de ANBAX®?

ANBAX® puede ocasionar graves efectos secundarios, incluidos:

1. Exceso de ácido láctico en la sangre (acidosis láctica). El organismo produce normalmente ácido láctico, pero una cantidad excesiva de ácido láctico constituye una emergencia médica grave. Aunque puede tratarse, también puede provocar la muerte.

Llame a su médico de inmediato si presenta estos síntomas.

Debilidad o sensación de cansancio mayor que lo habitual.

Dolor muscular inusual.

Falta de aliento o respiración acelerada.

Náuseas, vómito, y dolor en el área estomacal.

Manos y pies fríos o de color azulado.

Mareos o aturdimiento.

Latidos cardíacos acelerados o anormales.

2. Problemas hepáticos graves. Puede producirse problemas hepáticos graves en la persona que toma ANBAX. En algunos casos, estos problemas hepáticos pueden llevar a la muerte. Es posible que aumente el tamaño del hígado y sienta dolor a la palpación. Puede desarrollarse grasa en el hígado cuando toma ANBAX®

Llame a su médico de inmediato si presenta estos síntomas.

La piel o la parte blanca de los ojos se pone amarilla.

Orina de color té oscuro.

Heces de color claro.

Pérdida del apetito durante varios días o más.

Náuseas.

Dolor en el área estomacal.

Es posible que seas más propenso a desarrollar acidosis láctica o problemas hepáticos graves si es mujer, si tiene sobrepeso (es obeso) o si ha tomado ANBAX® durante un largo plazo.

3. Si además tiene una afección por el virus de la hepatitis B (VHB) y toma ANBAX®, es posible que su hepatitis B se agrave si deja de tomar ANBAX®.

No deje de tomar ANBAX® sin hablar primero con su médico

No quede sin ANBAX®. Repita su receta o hable con su médico antes de que se le agoten completo las dosis de ANBAX®. Si su médico le indica interrumpir el uso de ANBAX®, será necesario que lo vigile de cerca, durante varios meses, a fin de controlar la infección por el virus de la hepatitis B o administrarle un medicamento para tratar la hepatitis B.

Hable con su médico sobre los síntomas nuevos o poco comunes que pueda tener después de interrumpir el uso de ANBAX. Para obtener más información sobre los efectos secundarios. Consulte la sección ¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de ANBAX®?

¿Qué es ANBAX® para qué se utiliza y quienes deben tomarlo?

ANBAX® Es un tipo de medicamento inhibidor nucleosídico de la transcriptasa del VIH-1 contiene los medicamentos de venta bajo receta emtricitabina y tenofovir. ANBAX® se utiliza siempre con otros medicamentos antivirales para el tratamiento de personas con infección por el VIH-1, está indicado en:

_Adultos y niños a partir de los 12 años de edad.

ANBAX®: puede ayudar a:

_Reducir la cantidad de VIH-1 en su sangre. esto se denomina "carga viral". _Aumentar la cantidad de linfocitos CD4+(T) en la sangre que ayuda a combatir las infecciones. - Reducir la cantidad de VIH-1 y aumentar el recuento de linfocitos CD4+(T) en la sangre puede ayudar a mejorar el sistema inmunológico. Esto puede reducir el riesgo de muerte o infecciones que pueden ocurrir cuando su sistema inmunológico está débil.

_ ANBAX® no cura el VIH-1 ni el SIDA. Si tiene una infección por el VIH-1, debe seguir tomando medicamentos contra el VIH-1 para controlar la infección y disminuir las enfermedades relacionadas con el VIH-1.

_ No se sabe si ANBAX® Es seguro y eficaz en niños infectados contra el VIH-1 que son menores de 12 años o que pesan menos de 35kg.

ANBAX® Está indicado en combinación con otros agentes antirretrovirales (como los inhibidores de la transcriptasa reversa no nucleosídicos o los inhibidores de la proteasa). Se utiliza para el tratamiento de la infección VIH-1 en pacientes adultos pediátricos a partir de 12 años o más. Indicando en combinación con prácticas de sexo seguro para profilaxis previa a la exposición (PrEP) para reducir el riesgo de adquirir VIH-1 por vía sexual en adultos de alto riesgo.

No tome ANBAX®

Si es alérgico a ANBAX o a algunos de sus componentes. Los principales activos son emtricitabina y el tenofovir.

¿Qué debe informarle a su médico antes de tomar ANBAX®?

- Tiene problemas hepáticos, incluida la infección por el virus de la Hepatitis B.
- Tiene problemas renales o está bajo tratamiento de diálisis renal.
- Tiene problemas Óseos.

- Tiene alguna otra actividad.
- Está embarazada o planea quedar embarazada. No se sabe si ANBAX® puede dañar el feto.

Registros de embarazos: se ha establecido un registro de embarazos que recopila información sobre su salud y la salud de su bebé. Existe un registro de embarazos para las mujeres que toman medicamentos para tratar o prevenir el VIH-1 durante el embarazo. Hable con su médico para obtener más información sobre el registro y su funcionamiento.

- Está amamantado o planea amamantar.
- No debe amamantar si tiene el VIH-1. existe el riesgo de que transmita el VIH-1 a su bebé. No amamante si toma ANBAX®. ANBAX® puede pasar a su bebé a través de la leche materna. Hable con su médico acerca de la mejor forma de alimentar a su bebé. Informe a su médico sobre todos los medicamentos que toma, incluso los medicamentos de venta bajo receta y los de venta libre, las vitaminas y los suplementos a base de hierbas.
- No tome ANBAX® si además ya está utilizando asociaciones en dosis fijas de emtricitabina, tenofovir y efavirenz, o de emtricitabina, tenofovir y rilpivarina, o de elvitegravir, cobicistat, emtricitabina y tenofovir. No tome ANBAX® si ya está recibiendo lamivudinalzidovunida, emtricitabina, lamivudina, sulfato de abacavir/ lamivudina, sulfato de abacavir/ lamivudinalzidovunida o tenofovir, ya que estos medicamentos contienen los mismos principios activos o principios activos similares.
- Otros medicamentos que contengan tenofovir o emtricitabina.
- Medicamentos que contengan lamivudina.
- Adenofovir.
- ANBAX® puede interactuar con otros medicamentos. En particular informe a su médico si toma: Didanosina, Daronavir, Atazanavir, Lopinavir con ritonavir.

Es posible que su médico deba examinarlo con mayor frecuencia o que le modifique la dosis si toma alguno de estos medicamentos con ANBAX®. Sepa qué medicamentos toma. Conserve una lista de estos para mostrarle a su médico o a su farmacéutico cuando obtenga un nuevo medicamento.

¿Cómo debo tomar ANBAX®?

Tome ANBAX® según lo indicado. Tome los comprimidos de ANBAX® por boca, con o sin alimentos. Anbax se toma habitualmente 1 comprimido 1 vez al día. Siempre se toma con otros medicamentos contra el VIH-1. Tome ANBAX® a la misma hora todos los días para que los niveles sanguíneos VIH-1 se mantengan constantes.

Si tienes problemas renales, es posible que su médico le recomiende tomar ANBAX® con una frecuencia menor.

No omita ninguna dosis de ANBAX®.

La omisión de una dosis disminuye la cantidad del medicamento presente en la sangre.

Si se olvida una dosis de ANBAX[®], tómela apenas se acuerde ese mismo día.
No tome más de 1 dosis ANBAX[®] al día. No tome 2 dosis al mismo tiempo para compensar una dosis que olvido.
Llame a su médico si no esta seguro de qué hacer.
No cambie su dosis ni interrumpa el uso de ANBAX[®], sin antes de hablar a su médico.
Debe permanecer bajo el cuidado de un médico mientras toma ANBAX[®].
Renueve su receta de ANBAX[®] antes de que se le agote el medicamento.
Si toma demasiado ANBAX[®], llame al centro de toxicología local o vaya al hospital de urgencias más cercano de inmediato.
Si toma ANBAX[®] para tratar la infección VIH-1, es necesario que tome otros medicamentos contra el VIH-1. Su médico le indicará qué medicamentos utilizar y cómo tomarlos.

¿Qué debo evitar mientras tomo ANBAX[®]?

Mientras tome ANBAX[®], evite hacer cosas que puedan incrementar el riesgo de contagiar el VIH-1 a otras personas.

No tenga ningún tipo de relación sexual sin usar protección.
Siempre tome los mayores recaudos de seguridad al tener relaciones sexuales.
Use preservativos de látex o poliuretano para reducir el contacto del semen, los líquidos vaginales o la sangre.
No comparta elementos personales que puedan tener sangre o líquidos corporales, como cepillos de dientes y hoja de afeitar.
No comparta ni reutilice agujas ni otro tipo de inyección.
Consulte su médico si tiene alguna pregunta acerca de cómo evitar la transmisión VIH-1 a otras personas.

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de ANBAX[®]?

ANBAX puede causar efectos secundarios graves, que incluyen:

Consulte ¿Cuál es la información más importante que debo saber sobre ANBAX[®]?

Puede ocurrir problemas renales nuevos o empeoramiento de los problemas ya existentes, lo que incluye insuficiencia renal. Si tuvo problemas renales con anterioridad o toma otro medicamento que le pueda causar problemas renales, es posible que su médico le realice análisis de sangre para controlar los riñones antes de que comience a tomar ANBAX[®] y durante el tratamiento. Su médico puede decirle que tome ANBAX[®] con menos frecuencia o que deje de tomar ANBAX[®] si tiene problemas renales.

Pueden ocurrir problemas óseos en algunas personas que toman ANBAX[®]. Los problemas óseos incluyen dolor en los huesos o ablandamiento o adelgazamiento de los huesos, lo

que puede producir fracturas. Es posible que su médico necesite realizarle pruebas adicionales para controlarle los huesos.

Pueden ocurrir cambios en la grasa corporal en algunas personas que toman medicamentos contra el VIH-1. Se desconocen las causas precisas y los efectos a largo plazo de estos problemas.

Los cambios pueden incluir:

Mayor cantidad de grasa en la parte superior de la espalda y el cuello ("Joroba de búfalo").
En los pechos y alrededor de la parte principal del cuerpo (Tronco).

Pérdida de grasa en las piernas, los brazos y el rostro.

Pueden ocurrir cambios en el sistema inmunológico (Síndrome de reconstitución inmunológica) cuando una persona infectada por el VIH-1 comienza a tomar medicamentos contra el VIH-1. Es posible que el sistema inmunológico se vuelva más fuerte, y esto puede provocarle inflamación en áreas del cuerpo donde podría haber infecciones que han permanecido ocultas durante mucho tiempo. Esta inflamación puede ocasionarle síntomas menores, como fiebre, pero la inflamación también puede generar problemas graves. Informe a su médico de inmediato si comienza a presentar nuevos síntomas después de empezar a tomar ANBAX[®] para el tratamiento de la infección VIH-1.

Los efectos secundarios más comunes de ANBAX[®] son:

- Diarrea.
- Náuseas.
- Cansancio.
- Mareos.
- Depresión.
- Problemas para dormir.
- Dolor de cabeza.
- Sueños anormales.
- Sarpullidos.

Infórmele a su médico si alguno de estos efectos secundarios lo perturban o no desaparecen. Estos no son todos los efectos secundarios posibles de ANBAX[®]. Para obtener más información, pregúntele a su médico o al farmacéutico. Llame a su médico y pídale asesoramiento sobre los efectos secundarios.

Condiciones de almacenamiento

Almacene ANBAX[®] a temperatura ambiente por debajo de 25 °c.

Mantenga ANBAX[®] en su envase original y bien cerrado.

Mantenga ANBAX[®] y todo otro medicamento fuera del alcance de los niños.

Información general sobre ANBAX®

Los medicamentos se recetan para otros fines además de los que figuran en una Guía sobre el medicamento.

No utilice ANBAX® para una enfermedad por el cual no fue recetado.

No administre ANBAX® a otras personas, aún cuando tengan los mismos síntomas que usted, porque podría provocarles daños.

Esta Guía sobre el medicamento resume la información más importante sobre ANBAX®.

Si desea obtener más información, hable con su médico. Puede solicitar a su médico o farmacéutico información sobre ANBAX® dirigida a profesionales de la salud.

¿Cuáles son los componentes de ANBAX®

Cada comprimido recubierto contiene:

Tenofovir disoproxil fumarato 300mg (equivalente a 245mg tenofovir disoproxil)

Emtricitabina: 200mg.

Excipientes: Lactosa monohidrato, Crospovidona, Povidona, Estearil fumarato de sodio, Manitol, Celulosa microcristalina, Dióxido de silicio coloidal hidratado, Polivinil alcohol, Dióxido de titanio, Macrogol, Talco, Colorante FD&C N°2 azul, Carmín.