



escanea y escucha el folleto



teva

FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PACIENTE PAROXETINA COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 20 mg

Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este medicamento. Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está seguro de algo, pregunte a su médico o farmacéutico. Guarde este folleto, puede necesitar leerlo nuevamente. Verifique que este medicamento corresponda exactamente al indicado por su médico.

Orientación al paciente: Estimado(a) Usuario (a): Su médico le ha prescrito Paroxetina, el tratamiento antidepresivo más adecuado para su patología. Lea cuidadosamente estas instrucciones antes de comenzar el tratamiento. Guarde este folleto y compruebe que el medicamento corresponde al que su médico le indicó. Si tiene cualquier duda consulte a su médico.

¿Qué es Paroxetina?: Paroxetina es un medicamento para el tratamiento de episodios de depresión mayor, trastorno compulsivo, trastorno de angustia con o sin agorafobia, trastorno social de angustia/fobia social, trastorno generalizado de angustia, trastorno postraumático.

¿Cómo debo tomar Paroxetina?: Es importante que el comprimido sea ingerido con agua y que no sea masticado, tómelo siempre a la hora y en la cantidad exacta que le recetó su médico. Si cree que necesita otra dosis consulte a su médico antes de tomarla.

¿Qué debo hacer si me ocurre alguna molestia mientras tome Paroxetina?: Ante cualquier duda sobre alguna molestia no habitual mientras esté en tratamiento, siempre consulte a su médico.

Recomendaciones generales: Evite manejar vehículos y maquinaria pesada durante el tratamiento. Evite su consumo durante el embarazo y lactancia. No consuma otros antidepresivos mientras esté tomando Paroxetina. Informe a su médico de todos los medicamentos que esté usando. Evite el consumo de alcohol mientras esté en tratamiento con Paroxetina. Mantenga el producto en su envase original, protegido del calor y humedad, y alejado de los niños.

COMPOSICIÓN Y PRESENTACIÓN: Cada comprimido contiene: Paroxetina (como Clorhidrato Hemihidrato) 20 mg / Excipientes: Glicolato sódico de almidón de papa tipo A, magnesio estearato, celulosa microcristalina, calcio fosfato, poliacrilato dispersión, talco, dióxido de titanio, simeticona, macrogol, hipromelosa.

INDICACIONES: Tratamiento de: Episodios de depresión mayor, trastorno compulsivo, trastorno de angustia con o sin agorafobia, trastorno social de angustia/fobia social, trastorno generalizado de angustia, trastorno postraumático.

CLASIFICACIÓN: Antidepresivo

DOSIS: El médico debe indicar la posología y el tiempo de tratamiento apropiados a su caso particular. No obstante, las dosis recomendadas han sido: De 10 a 60 mg una vez en el día, dependiendo de la enfermedad a tratar y de la respuesta del paciente. El tratamiento debe efectuarse bajo supervisión directa del médico.

MODO DE EMPLEO: Administrar por vía oral. Para aliviar la sequedad de la boca, utilizar caramelos o chicles sin azúcar o simplemente hielo. Discontinuar el medicamento gradualmente.

ADVERTENCIAS y PRECAUCIONES: Consulte con su médico o farmacéutico antes de empezar a tomar Paroxetina

- Si está tomando otros medicamentos (ver el apartado "Interacciones") / • Si está tomando tamoxifeno para el tratamiento del cáncer de mama (o problemas de fertilidad). Paroxetina puede hacer que tamoxifeno sea menos efectivo, por lo que su médico debería recomendarle tomar otro antidepresivo. / • Si padece algún problema de riñón, hígado o corazón. / • Si tiene anomalía en su corazón detectada a través de un electrocardiograma (ECG) conocida como prolongación del intervalo QT / • Si tiene antecedentes familiares de prolongación del intervalo QT, enfermedades cardíacas como insuficiencia cardíaca, frecuencia cardíaca baja o niveles bajos de potasio o niveles bajos de magnesio. / • Si padece epilepsia o si presenta convulsiones o crisis epilépticas. / • Si ha tenido episodios maníacos (pensamientos o comportamientos excesivamente activos) / • Si está siendo tratado con terapia electro-convulsiva (TEC) / • Si tiene propensión al sangrado o a la aparición de hematomas, o está siendo tratado con algún medicamento que pueda aumentar el riesgo de hemorragia (incluyendo medicamentos tales como Warfarina (acenocumarol), antipsicóticos como perfenazina o clozapina, antidepresivos tricíclicos, medicamentos para tratar el dolor y la inflamación llamados antiinflamatorios no esteroideos (AINEs), como ácido acetilsalicílico, ibuprofeno, celecoxib, ketorolaco, diclofenaco, meloxicam, naproxeno) / • Si padece diabetes / • Si está tomando una dieta baja en sodio / • Si padece glaucoma (tensión ocular elevada) / • Si está embarazada o si piensa quedarse embarazada (vea el apartado "Embarazo, lactancia y fertilidad") / • Si tiene menos de 18 años (vea el apartado "Niños y adolescentes menores de 18 años")

Si está en alguna de estas situaciones y aún no ha consultado a su médico, pregúntele sobre cómo tomar Paroxetina

Pensamientos de suicidio y empeoramiento de su depresión o trastorno de ansiedad

Si usted está deprimido y/o tiene trastornos de ansiedad, a veces puede tener pensamientos de hacerse daño a sí mismo o suicidarse. Éstos pueden aumentar al principio del tratamiento con antidepresivos, ya que todos estos medicamentos tardan un tiempo en hacer efecto, que normalmente es de unas dos semanas, pero a veces puede ser más tiempo.

Es más probable que le suceda esto

- Si usted ya ha tenido previamente pensamientos de suicidio o de hacerse daño a sí mismo.
- Si es usted un adulto joven. Hay información de ensayos clínicos que muestran que existe un aumento del riesgo de conductas suicidas en adultos menores de 25 años con enfermedades psiquiátricas que estaban siendo tratados con algún antidepresivo.

Si tiene pensamientos de hacerse daño a sí mismo o suicidarse en cualquier momento, consulte a su médico o acuda al hospital inmediatamente. Puede ser útil para usted explicarle a algún familiar o a un amigo cercano que está deprimido o tiene trastornos de ansiedad, y pedirles que lean este prospecto. Puede pedirles también que le digan si piensan que su depresión o ansiedad está empeorando, o si están preocupados por los cambios en su conducta.

CONTRAINDICACIONES: No tome Paroxetina

- Si está siendo tratado con medicamentos denominados inhibidores de la enzima monoamino oxidasa (IMAO, incluyendo moclobemida y cloruro de metiltionina (azul de metileno), o si ha estado bajo tratamiento con cualquiera de estos medicamentos en las dos últimas semanas. Su médico le aconsejará cómo debe empezar a tomar Paroxetina una vez que haya dejado de tomar el IMAO / • Si está tomando un medicamento antipsicótico denominado tioridazina o el antipsicótico denominado primozida / • Si es alérgico a Paroxetina o a alguno de los demás componentes de este medicamento.

Si está en alguna de estas situaciones, comuníquesele a su médico y no tome Paroxetina

INTERACCIONES: Algunos medicamentos pueden modificar el efecto de Paroxetina o hacer más probable que aparezcan algunos efectos adversos. Paroxetina también puede modificar el efecto de algunos medicamentos. Por ejemplo:

- Medicamentos llamados inhibidores de la monoamino-oxidasa (IMAO, incluyendo moclobemida y cloruro de metiltionina (azul de metileno)). Vea el apartado "Contraindicaciones"
- Los medicamentos conocidos por incrementar el riesgo de cambios en la actividad eléctrica del corazón (p. ej. los antipsicóticos tioridazina o pimozida). Vea el apartado "Contraindicaciones"
- / • Ácido acetilsalicílico, ibuprofeno y otros medicamentos llamados antiinflamatorios no esteroideos como celecoxib, etodolaco, diclofenaco y meloxicam, usados para tratar el dolor y la inflamación. / • Tramadol, buprenorfina y petidina, analgésicos. / • Buprenorfina combinada con naloxona, tratamiento de sustitución para la adicción a los opiáceos. / • Medicamentos llamados triptanes, como el sumatriptán, usados para tratar la migraña. / • Otros antidepresivos, incluyendo otros inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina y antidepresivos tricíclicos como clomipramina, nortriptilina y desipramina. / • Un suplemento de la dieta llamado triptófano. / • Mivacurio y suxametonio (usados en anestesia). / • Medicamentos como el litio, risperidona, perfenazina, clozapina (antipsicóticos) usados para tratar algunas enfermedades psiquiátricas. / • Fentanilo, usado en anestesia o para tratar el dolor crónico. / • Una combinación de fosamprenavir y ritonavir, usada para tratar la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH). / • Hierba de San Juan, una hierba medicinal para tratar la depresión. / • Fenobarbital, fenitoína, valproato de sodio o carbamacepina, usados para tratar las convulsiones o la epilepsia. / • Atomoxetina, medicamento usado para tratar el trastorno de déficit de atención e hiperactividad (TDAH). / • Proclidina, usado para aliviar el temblor, especialmente en la enfermedad de Parkinson. • Warfarina y otros medicamentos (denominados anticoagulantes) usados para evitar la formación de coágulos en la sangre. / • Propafenona, flecainida y medicamentos usados para tratar los trastornos del ritmo cardíaco. / • Metoprolol, un beta-bloqueante usado para tratar la tensión arterial alta y los trastornos cardíacos. / • Pravastatina, usado para tratar el colesterol elevado. / • Rifampicina, usado para tratar la tuberculosis (TB) y la lepra. / • Linezolid, un antibiótico. / • Tamoxifeno, usado para tratar el cáncer de mama (o problemas de fertilidad).

Si está tomando o ha tomado recientemente alguno de estos medicamentos, comuníquesele a su médico y consulte qué debe hacer. Puede que su médico decida cambiar la dosis o prescribirle otro medicamento. Comuníquese a su médico o farmacéutico si está tomando, ha tomado recientemente o podría tener que tomar cualquier otro medicamento, incluso los adquiridos sin receta.

Toma de Paroxetina con alimentos, bebidas y alcohol: No consuma alcohol mientras esté tomando Paroxetina. El alcohol puede empeorar sus síntomas o los efectos adversos. Tomar Paroxetina por la mañana con alimentos, puede reducir la probabilidad de que aparezcan náuseas.

REACCIONES ADVERSAS IMPORTANTES OBSERVADAS CON PAROXETINA: Algunos pacientes que toman Paroxetina desarrollan un trastorno llamado acatisia, y se sienten intranquilos y que no pueden sentarse o quedarse quietos. Otros pacientes desarrollan el llamado síndrome serotoninérgico o síndrome neuroléptico maligno, y pueden tener alguno o todos los síntomas siguientes: sentirse muy agitado o irritable, confusión, inquietud, sensación de calor, sudoración, temblor, escalofríos, alucinaciones (visiones o sonidos extraños), agarrotamiento muscular, movimientos bruscos repentinos o aumento del ritmo del corazón. La gravedad puede aumentar y conducir a una pérdida de consciencia. Consulte a su médico si tiene alguno de estos síntomas. Para más información sobre este u otros efectos adversos de Paroxetina, vea la sección "Posibles reacciones adversas".

Algunos medicamentos del grupo al que pertenece Paroxetina (llamados ISRS) pueden causar síntomas de disfunción sexual (ver sección "Posibles reacciones adversas"). En algunos casos, estos síntomas persisten después de suspender el tratamiento.

No interrumpa el tratamiento hasta que su médico se lo indique.

Cuando interrumpa el tratamiento con Paroxetina, su médico le indicará cómo reducir las dosis lentamente durante un periodo de varias semanas o meses, esto ayudará a reducir el riesgo de sufrir síntomas de retirada. Una forma de hacerlo es reducir gradualmente la dosis de Paroxetina que está tomando en 10 mg cada semana. La mayoría de las personas consideran que los posibles síntomas que ocurren cuando se interrumpe el tratamiento con Paroxetina son leves y desaparecen por sí solos en dos semanas. Para otras personas, estos síntomas pueden ser más graves o durar más tiempo. Los posibles efectos de retirada se encuentran en el apartado "Posibles efectos de retirada cuando se interrumpe el tratamiento" en la sección "Posibles efectos adversos".

Si sufre efectos debidos a la retirada mientras está interrumpiendo su tratamiento, el médico puede decidir que lo interrumpa más lentamente. Si experimenta síntomas de retirada graves, por favor, consulte a su médico. Éste podría aconsejarle que inicie el tratamiento de nuevo y que posteriormente lo interrumpa de una forma más lenta.



escanea y escucha el folleto



teva

Niños y adolescentes menores de 18 años: Paroxetina no deberá utilizarse en el tratamiento de niños y adolescentes menores de 18 años. Asimismo, debe saber que en pacientes menores de 18 años existe un mayor riesgo de efectos adversos como intentos de suicidio, ideas de suicidio y hostilidad (predominantemente agresión, comportamiento de confrontación e irritación) cuando se toma Paroxetina. Pese a ello, el médico puede prescribir Paroxetina a pacientes menores de 18 años cuando decida que es lo más conveniente para el paciente. Si su médico le ha prescrito Paroxetina a usted o a su hijo menor de 18 años y desea comentar esta decisión, consulte a su médico. Debe informar a su médico si alguno de los síntomas que se han detallado anteriormente aparecen o empeoran cuando usted o su hijo menor de 18 años estén tomando Paroxetina. Los efectos a largo plazo de Paroxetina en lo que a la seguridad se refiere, relativos al crecimiento, la madurez y el desarrollo cognitivo y conductual en este grupo de edad todavía no se han demostrado.

En estudios realizados con Paroxetina en pacientes menores de 18 años los efectos adversos frecuentes, que afectaron a menos de 1 de cada 10 niños o adolescentes fueron: un aumento en los pensamientos e intentos de suicidio, intento de autolesionarse, comportamientos hostiles, agresivos o poco amistosos, falta de apetito, temblores, sudoración anormal, hiperactividad (tener demasiada energía), agitación, emociones inestables (incluyendo llantos y cambios de estado de ánimo) y aparición de cardenales fortuitos o sangrado (como sangrado por la nariz). Estos efectos también se observaron en pacientes incluidos en estos estudios que no tomaron Paroxetina, aunque con menor frecuencia. Al interrumpir el tratamiento con Paroxetina, en estos estudios algunos de los pacientes menores de 18 años notificaron tener efectos adversos de retirada. Estos efectos fueron muy similares a los observados en los adultos que interrumpieron el tratamiento con Paroxetina (vea la sección "Posibles efectos de retirada cuando se interrumpe el tratamiento"). Además, los pacientes menores de 18 años experimentaron de forma frecuente (afectando a menos de 1 de cada 10), dolor de estómago, nerviosismo y emociones inestables (incluyendo llanto, cambios de estado de ánimo, intento de autolesionarse, pensamientos e intentos de suicidio).

EMBARAZO, LACTANCIA Y FERTILIDAD

Embarazo: Si está embarazada o en periodo de lactancia, cree que podría estar embarazada o tiene intención de quedarse embarazada, consulte a su médico o farmacéutico antes de utilizar este medicamento.

En algunos estudios se ha observado un aumento del riesgo de malformaciones, en particular las que afectan al corazón, en recién nacidos cuyas madres tomaron Paroxetina durante los primeros meses del embarazo. En la población general, aproximadamente 1 de cada 100 recién nacidos nacen con una malformación del corazón. Esta proporción aumentó hasta 2 de cada 100 recién nacidos en madres que tomaron Paroxetina. Su médico de acuerdo con usted, podría cambiarle a otro tratamiento o interrumpir gradualmente el tratamiento con Paroxetina mientras esté embarazada. Sin embargo, dependiendo de sus circunstancias, su médico podría recomendarle continuar tomando Paroxetina.

Asegúrese de que su médico o matrona saben que está tomando Paroxetina. Si toma Paroxetina en la etapa final del embarazo puede producirse un mayor riesgo de sangrado vaginal abundante poco después del parto, especialmente si tiene antecedentes de alteraciones hemorrágicas. Su médico o matrona deben saber que usted está tomando Paroxetina para poderle aconsejar. Los medicamentos como Paroxetina pueden aumentar el riesgo de aparición de una enfermedad grave denominada hipertensión pulmonar persistente del recién nacido (HPP), cuando se toma durante el embarazo y particularmente al final de éste. La presión en los vasos sanguíneos que van entre el corazón y los pulmones es muy elevada en recién nacidos con hipertensión pulmonar persistente (HPP).

Si está tomando Paroxetina en el último trimestre del embarazo, su recién nacido puede también presentar otros síntomas que normalmente comienzan durante las 24 primeras horas después del nacimiento. Entre estos síntomas se incluyen:

• dificultad para respirar / • piel azulada o aspecto de tener mucho calor o frío / • labios azulados / • vómitos o dificultades en las tomas de alimento / • sentirse muy cansado, dificultad para dormir o llanto frecuente / • rigidez o flacidez muscular / • temblores, temblores localizados o convulsiones / • reflejos exagerados.

Si su bebé tiene alguno de estos síntomas al nacer, o si está preocupado sobre la salud de su recién nacido, contacte con su médico o matrona, quienes le aconsejarán.

Lactancia: Paroxetina pasa a la leche materna en muy pequeñas cantidades. Consulte a su médico si está tomando Paroxetina antes de comenzar a amamantar. Su médico, de acuerdo con usted, podría aconsejarle mantener la lactancia materna mientras toma Paroxetina.

Fertilidad: Estudios con animales han mostrado que la paroxetina reduce la calidad del esperma.

Teóricamente esto puede afectar a la fertilidad en humanos, pero todavía no se ha observado este impacto en las personas.

CONDUCCIÓN Y USO DE MÁQUINAS: Algunos de los efectos adversos que puede causar Paroxetina son mareo, confusión, sensación de somnolencia o visión borrosa. Si usted sufre alguno de estos efectos, no conduzca vehículos ni use máquinas.

POSIBLES EFECTOS ADVERSOS: Al igual que todos los medicamentos, este medicamento puede producir efectos adversos, aunque no todas las personas los sufran. Es más probable que los efectos adversos aparezcan durante las primeras semanas de tratamiento con Paroxetina.

Informe a su médico de inmediato o acuda al hospital de inmediato si sufre cualquiera de los efectos adversos descritos a continuación durante el tratamiento con Paroxetina.

Efectos adversos poco frecuentes (pueden afectar hasta 1 de cada 100 personas)

• Si tiene cardenales o sangrado inusuales, como sangre en el vómito o en las heces. / • Si sufre imposibilidad de orinar.

Efectos adversos raros (pueden afectar hasta 1 de cada 1.000 personas)

• Si experimenta convulsiones (crisis epilépticas), contacte con su médico o acuda al hospital de inmediato. / • Si tiene sensación de inquietud, incapacidad para permanecer sentado o permanecer quieto, denominada acatisia. Incrementar la dosis de Paroxetina puede empeorar sus síntomas. Si se siente así, consulte a su médico. / • Cansancio, debilidad, confusión y dolor, rigidez y falta de coordinación muscular. Esto puede deberse a que el contenido de sodio en la sangre sea bajo.

Efectos adversos muy raros (pueden afectar hasta 1 de cada 10.000 personas)

• Reacciones alérgicas a Paroxetina que pueden ser graves. / • Si desarrolla erupción cutánea con enrojecimiento y bultos, hinchazón de la cara, párpados, labios, boca o lengua, picor o dificultad para respirar (respiración difícil) o tragar, y sensación de debilidad o tener un vahído que puede ocasionar un colapso o pérdida de consciencia. / • Si nota alguno o todos los siguientes síntomas puede ser que sufra un síndrome serotoninérgico o síndrome neuroléptico maligno. Los síntomas incluyen:

sentirse muy agitado o irritable, confusión, inquietud, sensación de calor, sudoración, temblor, escalofríos, alucinaciones (sonidos o visiones extraños), agarrotamiento muscular, movimientos bruscos repentinos o latidos rápidos del corazón. La gravedad puede aumentar y conducir a una pérdida de consciencia. / • Glaucoma agudo (aumento de la presión dentro del ojo que puede causar daño y a veces pérdida de la visión)

Si le aparece un dolor en los ojos y visión borrosa, consulte con su médico.

Frecuencia no conocida (la frecuencia no puede estimarse a partir de los datos disponibles)

• Algunas personas han experimentado pensamientos de causarse lesiones a sí mismos o suicidarse mientras tomaban Paroxetina o al poco tiempo después de dejar el tratamiento (ver Pensamientos de suicidio y empeoramiento de su depresión o trastorno de ansiedad en la sección "Advertencias y precauciones"). / • Algunas personas han experimentado agresividad mientras tomaban Paroxetina. / • Sangrado vaginal abundante poco después del parto (hemorragia posparto), ver "Embarazo, lactancia y fertilidad" para más información.

Otros posibles efectos adversos durante el tratamiento:

Efectos adversos muy frecuentes

Pueden afectar a más de 1 de cada 10 personas

• Sensación de enfermedad (náuseas). Este efecto puede reducirse tomando su medicación por la mañana después del desayuno. / • Cambio en el deseo o función sexual, por ejemplo, falta de orgasmo y, en hombres, erección y eyacuación anormales.

Efectos adversos frecuentes

Pueden afectar hasta 1 de cada 10 personas

• Aumento de los niveles de colesterol en sangre. / • Disminución del apetito. / • Dificultad para dormir (insomnio) o somnolencia. / • Sueños anormales (incluyendo pesadillas). / • Mareo, temblores. / • Dolor de cabeza. / • Dificultad para concentrarse. / • Agitación. / • Debilidad inusual. / • Visión borrosa. / • Bostezo, sequedad de boca. / • Diarrea o estreñimiento. / • Vómitos. / • Ganancia de peso. / • Sudoración.

Efectos adversos poco frecuentes (pueden afectar hasta 1 de cada 100 personas)

• Aumentos transitorios de la presión arterial, o disminuciones transitorias de ésta que pueden provocar mareos o desmayos cuando se pone rápidamente de pie. / • Latidos del corazón más rápidos de lo normal. / • Falta de movimiento, rigidez, temblor o movimientos anormales de la boca y lengua. / • Dilatación de las pupilas. / • Erupción cutánea. / • Picor. / • Confusión. / • Alucinaciones (sonidos o visiones extraños). / • Incapacidad para orinar (retención urinaria) o incontinencia urinaria (micción incontrolada e involuntaria). / • Si es un paciente diabético puede notar la pérdida de control de los niveles de azúcar en sangre mientras toma Paroxetina. / Consulte a su médico sobre cómo ajustar su dosis de insulina o medicamentos para la diabetes. / • Leucopenia: disminución del número de glóbulos blancos en la sangre lo que disminuye la respuesta del sistema inmune incrementando el riesgo de padecer infecciones.

Efectos adversos raros (pueden afectar hasta 1 de cada 1.000 personas)

• Secreción anormal de leche materna en hombres y mujeres. / • Disminución del ritmo del corazón. / • Efectos en el hígado que se ven en las pruebas de laboratorio que indican el funcionamiento del hígado. / • Ataques de pánico. / • Comportamientos o pensamientos muy activos (manía). / • Sentirse separado de uno mismo (despersonalización). / • Ansiedad. / • Necesidad irresistible de mover las piernas (Síndrome de Piernas Inquietas). / • Dolor en articulaciones o músculos. / • Aumento en sangre de una hormona llamada prolactina. / • Alteraciones del periodo menstrual (incluyendo periodos abundantes o irregulares, sangrado entre periodos y ausencia o retraso del periodo).

Efectos adversos muy raros (pueden afectar hasta 1 de cada 10.000 personas)

• Erupción cutánea, en la que pueden aparecer ampollas con aspecto de pequeñas dianas (puntos centrales oscuros rodeados de un área pálida, con un anillo oscuro alrededor) llamado eritema multiforme. / • Erupción extendida con ampollas y descamación de la piel, especialmente alrededor de la boca, nariz, ojos y genitales (síndrome de Stevens-Johnson). / • Erupción extendida por una gran superficie corporal con ampollas y descamación de la piel (necrólisis epidérmica tóxica). / • Alteraciones en el hígado que ponen de color amarillo la piel o el blanco de los ojos. / • Síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética (SIHAD) que es un estado en el que el cuerpo desarrolla un exceso de agua y una disminución de la concentración de sodio (sal) como resultado de unas señales químicas inapropiadas. Los pacientes con SIHAD pueden sentirse gravemente enfermos o pueden no tener ningún síntoma. / • Retención de agua o líquido (que causan hinchazón de brazos o piernas). / • Sensibilidad a la luz del sol. / • Erección dolorosa y prolongada del pene. / • Disminución de la cantidad de plaquetas en sangre.

Frecuencia no conocida (la frecuencia no puede estimarse a partir de los datos disponibles)

• Inflamación del colon (que causa diarrea). / • Rechinar de dientes.

Algunos pacientes han experimentado zumbidos, silbidos, pitidos, campanilleo u otros ruidos persistentes en los oídos (acúfenos) cuando toman Paroxetina. Se ha observado que las personas que toman medicamentos como Paroxetina tienen mayor riesgo de fracturas de huesos.

Posibles efectos de retirada cuando se interrumpe el tratamiento

Estudios han demostrado que 3 de cada 10 pacientes experimentan uno o más síntomas cuando interrumpen su tratamiento con Paroxetina. Algunos de estos efectos ocurren con mayor frecuencia que otros.

Efectos adversos frecuentes

Pueden afectar hasta 1 de cada 10 personas

• Sentirse mareado, con inestabilidad o con alteraciones en el equilibrio. / • Hormigueo, sensaciones de quemazón y, con menor frecuencia, sensación de descarga eléctrica, incluso en la cabeza, zumbidos, silbidos, pitidos, campanilleo u otros ruidos persistentes en los oídos (acúfenos). / • Alteraciones del sueño (sueños muy vívidos, pesadillas, incapacidad para dormir). / • Ansiedad. / • Dolores de cabeza.



escanea y escucha el folleto



teva

Efectos adversos poco frecuentes

Pueden afectar hasta 1 de cada 100 personas

• Vómitos (náuseas). / • Sudoración (incluyendo sudoración nocturna). / • Inquietud o agitación. / • Temblor. / • Confusión o desorientación. / • Diarrea (heces blandas). / • Sentirse muy sensible o irritable. / • Alteraciones visuales. / • Palpitaciones rápidas o muy fuertes del corazón.

Consulte a su médico si le preocupan los efectos debidos a la retirada de Paroxetina.

SOBREDOSIS: En caso de sobredosis o ingestión accidental, consulte inmediatamente a su médico indicando el medicamento y la cantidad ingerida. No tome nunca más comprimidos de los que le ha recomendado su médico.

Una persona que haya tomado una sobredosis de Paroxetina puede tener alguno de los síntomas que aparecen en la sección "Posibles reacciones adversas"; o alguno de los siguientes síntomas: fiebre, contracción involuntaria de los músculos.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO: Mantener lejos del alcance de los niños; en su envase original; protegido del calor y la humedad. No use este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

**NO REPITA EL TRATAMIENTO SIN INDICACIÓN MÉDICA
NO RECOMIENDE ESTE MEDICAMENTO A OTRA PERSONA**

LABORATORIO CHILE S.A.
Santiago - Chile
www.laboratoriochile.cl